H·A·C·E·M·O·S / L·A·S / C·O·S·A·S / B·I·E·N

ENSAYO- TOMATE / ANA-BOR







CULTIVO DE TOMATE

ANA-BOR

ENSAYO- TOMATE / ANA-BOR




¿POR QUÉ UTILIZAR ANA-BOR ?

- Es una fuente de boro acompañada de ácidos orgánicos, lo que aumenta su absorción y su distribución, activando el desarrollo de tejidos.
- Contiene auxinas tipo ANA que estimulan el desarrollo y mejoran la retención de flores, reduciendo los abortos florales.
- La mezcla de boro y auxinas mejoran la calidad de los tejidos, el tamaño y la maduración de los frutos.
- Mejora los calibres de los frutos.


ENSAYO- TOMATE / ANA - BOR

CANTIDAD DE FLORES QUE SE TRANSFORMARON EN FRUTOS COSECHADOS





ANA-BOR



TESTIGO


¿CÓMO UTILIZAR ANA-BOR?

- Dosis de 1.6 cc/l (330cc en 200l de agua).
- Aplicaciones cada 15 días a partir de la aparición del primer racimo.
- Es compatible con la mayoría de las moléculas químicas.
- Para potencializar su efecto se puede aplicar conjuntamente con Rapicalcio. A dosis de 0.5 cc/l de Anabor y 1.25 cc/l de Rapicalcio.
- No aplicar conjuntamente con otros productos que contengan



SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN DE ANA-BOR SE PODRÁ:

- Aumentar el rendimiento en 1.4 ton/ha utilizando la dosis de 1.6 cc/l.
- Disminuir los abortos florales en un 20% respecto al tratamiento testigo.
- No se debe exceder la dosis de 1.6cc/l, de lo contrario se obtendrán resultados desfavorables.





ANA-BOR TESTIGO

Este ensayo se realizó en Sachica

Este lugar tiene problemas de salinidad, por lo que el rendimiento puede ser inferior comparado con otras zonas del país.